

Tópicos de Matemática Elementar

Exercícios Preliminares – 2003/04

I. Lógica Básica

1. Negue cada uma das afirmações seguintes:

- (a) Ela tem aulas de piano e de guitarra.
- (b) Ele toca piano ou guitarra (ou ambos).
- (c) Ele ou toca piano ou toca guitarra (mas não ambos).
- (d) Não há extraterrestres azuis e não há unicórnios verdes.
- (e) Das duas uma só é verdadeira: ou não há extraterrestres azuis ou não há unicórnios verdes.
- (f) Todos os seres humanos são racionais.
- (g) Todos os seres humanos são irracionais.
- (h) Há seres humanos que são racionais.
- (i) Há seres humanos que são irracionais.
- (j) Nenhum ser humano é racional.
- (k) Nenhum ser humano é irracional.
- (l) Pelo menos um ser humano é racional.
- (m) Pelo menos um ser humano é irracional.
- (n) Se um número é divisível por 3, então é divisível por 6.
- (o) Se chove, então há pelo menos três nuvens no céu.

2. Para cada uma das proposições seguintes, todas da forma " $A \Rightarrow B$ ", diga se a proposição " $B \Rightarrow A$ " correspondente é verdadeira ou falsa. Depois escreva, em português, a correspondente proposição " $\neg B \Rightarrow \neg A$ ".
- (a) Se um número é divisível por 6 então é divisível por 3.
- (b) Se chove, então há nuvens no céu.
3. Dê exemplo de três proposições da forma " $A \Rightarrow B$ ", em linguagem do dia-a-dia e diferentes das que aparecem nos exercícios anteriores, tais que a correspondente proposição " $B \Rightarrow A$ " seja falsa.
4. Quais das condições seguintes são *necessárias* para o número natural n ser divisível por 6? E quais são *suficientes*?
- (a) n é divisível por 3.
- (b) n é múltiplo de 12.
- (c) n^2 é divisível por 9.
- (d) n é par e é divisível por 3.
5. Preencha a tabela seguinte, sem recorrer a apontamentos ou memória, pensando apenas no significado das diferentes expressões:

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \forall B$	$A \Rightarrow B$	$(\neg A) \vee B$	$A \wedge (\neg B)$	$A \Leftrightarrow B$
V	V								
V	F								
F	V								
F	F								

6. Quando Alice entrou na Floresta do Esquecimento, não esqueceu *tudo*; apenas certas coisas. Por vezes esquecia-se do seu nome, mas o que ela mais frequentemente esquecia era o dia da semana.

O Leão e o Unicórnio eram visitantes regulares da floresta. Estes dois eram criaturas muito estranhas. O Leão mentia às segundas, terças e quartas, e dizia a verdade nos restantes dias da semana. O Unicórnio, por seu lado, mentia às quintas, sextas e sábados, mas dizia a verdade nos outros dias da semana*.

(a) Um dia Alice encontrou o Leão e o Unicórnio a descansar sob uma árvore. Fizeram as seguintes afirmações:

Leão: Ontem foi um dos dias em que eu minto.

Unicórnio: Ontem foi também um dos dias em que minto.

A partir destas duas afirmações, Alice (que era uma rapariga muito inteligente) conseguiu deduzir que dia da semana era. Que dia era?

(b) Numa outra ocasião, Alice encontrou o Leão sózinho. Este fez as duas afirmações seguintes:

– Eu menti ontem.

– Mentirei novamente dois dias depois de amanhã.

Que dia da semana era?

(c) Em que dias da semana é possível para o Leão fazer as duas afirmações seguintes?

– Eu menti ontem.

– Mentirei novamente amanhã.

(d) Em que dias da semana é possível o Leão declarar:

– Eu menti ontem e mentirei novamente amanhã.

AVISO: A resposta não é a mesma que a do problema anterior!

* Esta série de exercícios é de: Raymond Smullyan, *What's the Name of This Book?*, Prentice-Hall, 1978.

7. Os irmãos gémeos Tweedledum e Tweedledee eram também visitantes regulares da floresta. Um deles comportava-se como o Leão, mentindo às segundas, terças e quartas, e dizendo a verdade nos restantes dias da semana. O outro tinha os hábitos do Unicórnio, mentindo às quintas, sextas e sábados, mas dizendo a verdade nos outros dias da semana. Alice não sabia qual era qual, e para tornar as coisas ainda piores, eles eram exactamente iguais (excepto quando usavam os seus colares, o que raramente faziam). Não é de admirar que a pobre Alice achasse toda esta situação bastante confusa!

Eis algumas das aventuras de Alice com Tweedledum e Tweedledee[†].

(a) Um dia Alice encontrou os irmãos juntos e estes disseram apenas:

Primeiro: Eu sou o Tweedledum.

Segundo: Eu sou o Tweedledee.

Qual era realmente Tweedledum e qual era Tweedledee?

(b) Num outro dia da mesma semana, os dois irmãos disseram o seguinte:

Primeiro: Eu sou o Tweedledum.

Segundo: Se isso for realmente verdade, então eu sou o Tweedledee!

Qual era qual?

(c) Numa outra ocasião, Alice encontrou os dois gémeos e perguntou a um deles, “Mentes aos domingos?” Ele respondeu “Sim”. Então fez a mesma pergunta ao outro. O que é que este respondeu?

(d) Noutra altura, os irmãos fizeram as seguintes declarações:

Primeiro: Eu minto aos sábados. Eu minto aos domingos.

Segundo: Eu vou mentir amanhã.

Que dia da semana era?

[†] Esta série de exercícios é de: Raymond Smullyan, *What's the Name of This Book?*, Prentice-Hall, 1978.

(e) Um dia a Alice encontrou apenas um dos irmãos. Este fez a seguinte afirmação:
“Eu hoje minto e sou o Tweedledee.” Quem era?

(f) E se, na situação anterior, tivesse sido dito: “Hoje minto ou sou o Tweedledee”,
seria possível determinar quem era?

(g) Um dia Alice encontrou os dois gémeos, que fizeram as seguintes declarações:

Primeiro: Se eu sou o Tweedledum, então ele é o Tweedledee.

Segundo: Se ele é o Tweedledee, então eu sou o Tweedledum.

É possível determinar quem é quem? É possível determinar o dia da semana?

(h) **Um mistério resolvido!**

Nesta memorável ocasião, a Alice resolveu três grandes mistérios. Encontrou os dois irmãos sorrindo, debaixo de uma árvore. Alice esperava descobrir três coisas. (1) o dia da semana; (2) qual deles era Tweedledum; (3) qual deles se comportava como Leão e qual tinha os hábitos do Unicórnio (algo que ela desejava à muito tempo saber!).

Bom, os dois gémeos fizeram as seguintes afirmações:

Primeiro: Hoje não é domingo.

Segundo: De facto, hoje é segunda-feira.

Primeiro: Amanhã é um dos dias em que Tweedledee mente.

Segundo: O Leão mentiu ontem.

Alice bateu palmas de alegria. O problema estava agora completamente resolvido. Qual é a solução?

II. Lógica, Conjuntos e Funções[‡]

1. Seja \mathcal{H} o conjunto de todos os seres humanos que existiram até hoje, e seja \mathcal{V} o conjunto de todos os seres humanos vivos neste momento (aquele em que lê estas palavras).

(a) Traduza por palavras cada uma das seguintes proposições, determine o seu valor lógico (*verdadeiro* ou *falso*), e escreva a sua negação em linguagem simbólica:

(i) $\forall x \in \mathcal{H} \exists y \in \mathcal{H} \quad y \text{ é mãe de } x.$

(ii) $\exists y \in \mathcal{H} \forall x \in \mathcal{H} \quad y \text{ é mãe de } x.$

(iii) $\forall x \in \mathcal{H} \exists y \in \mathcal{H} \quad x \text{ é mãe de } y.$

(iv) $\exists x \in \mathcal{H} \forall y \in \mathcal{H} \quad y \text{ é mãe de } x.$

(v) $\forall x \in \mathcal{V} \exists y \in \mathcal{V} \quad \neg(y \text{ é mãe de } x).$

(b) Seja $f : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ a função definida por $f(x) = \text{mãe de } x$, e sejam a, b dois elementos (distintos) do conjunto \mathcal{H} . Descreva por palavras os elementos dos conjuntos:

(i) $f^{-1}(\{a\})$.

(ii) $f^{-1}(\{a, b\})$.

(iii) $f^{-1}(\{a\}) \cap f^{-1}(\{b\})$.

(iv) $f^{-1}(\mathcal{V})$.

2. Identifique os seguintes conjuntos:

(a) $\{n \in \mathbb{N} \mid \exists m \in \mathbb{N} : n = 2m\}$.

(b) $\{n \in \mathbb{N} \mid (n > 1) \wedge (\forall x, y \in \mathbb{N})[(xy = n) \Rightarrow (x = 1 \vee y = 1)]\}$.

3. Mostre que $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

[‡] Alguns dos problemas desta secção são variações de exemplos e exercícios de: Keith Devlin, *Sets, Functions and Logic: an Introduction to Abstract Mathematics (2nd ed.)*, Chapman and Hall, 1992.

4. Demonstre que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$. Dê um exemplo que mostre que a igualdade por vezes não se verifica.
5. Sejam A e B dois subconjuntos de um conjunto \mathcal{U} . A *diferença simétrica* dos conjuntos A e B , é o conjunto definido por $A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
- (a) Diga a que é igual cada um dos seguintes conjuntos:
- (i) $A \triangle \emptyset$.
 - (ii) $A \triangle A$.
 - (iii) $A \triangle \mathcal{U}$.
 - (iv) $A \triangle \mathcal{C}(A)$.
- (b) Para todos $A, B, C \subseteq \mathcal{U}$, prove que $(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C)$.

III. Indução Matemática[§]

1. A prova por indução seguinte parece correcta, mas para $n = 6$ o lado esquerdo é igual a $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{5}{6}$, enquanto o direito é igual a $\frac{3}{2} - \frac{1}{6} = \frac{4}{3}$ (verifique!) Consegue descobrir o que está errado?

« Teorema: Para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1) \times n} = \frac{3}{2} - \frac{1}{n}.$$

Demonstração: Vamos usar indução em n . Se $n = 1$, então $\frac{3}{2} - \frac{1}{n} = \frac{1}{1 \times 2}$; e, supondo o teorema verdadeiro para um dado n , tem-se:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1) \times n} + \frac{1}{n \times (n+1)} &= \frac{3}{2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n(n+1)} = \\ &= \frac{3}{2} - \frac{1}{n} + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{3}{2} - \frac{1}{n+1}, \end{aligned}$$

e portanto o teorema é também verdadeiro para o número $n + 1$. »

[§]Todos os exercícios desta secção são de: Donald Knuth, *The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms (2nd ed.)*, Addison-Wesley, 1973.

2. Tem de haver qualquer coisa de errado com a seguinte demonstração; o que é?

«*Teorema*: Seja a um número positivo. Para todos os inteiros positivos n tem-se: $a^{n-1} = 1$.

Demonstração: Se $n = 1$, então $a^{n-1} = a^{1-1} = a^0 = 1$. Por indução, suponha-se que o teorema é verdadeiro para todos os números $1, 2, \dots, n$, para um dado n . Tem-se então:

$$a^{(n+1)-1} = a^n = \frac{a^{n-1} \times a^{n-1}}{a^{n-2}} = \frac{1 \times 1}{1} = 1;$$

portanto o teorema é também verdadeiro para o número $n + 1$. \gg

3. Use indução matemática para demonstrar as seguintes proposições:

(a) $0 < a < 1 \Rightarrow (1 - a)^n \geq 1 - na$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

(b) $(n \in \mathbb{N} \wedge n \geq 10) \Rightarrow 2^n > n^3$.

(c) $\forall n \in \mathbb{N} \quad 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \dots + n)^2$.

4. Encontre e demonstre uma fórmula simples para a soma:

$$\frac{1^3}{1^4 + 4} - \frac{3^3}{3^4 + 4} + \frac{5^3}{5^4 + 4} - \dots + \frac{(-1)^n (2n + 1)^3}{(2n + 1)^4 + 4}.$$

_____ \dots _____